

レジメン名	セツキシマブ+FOLFIRI
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日間
催吐性リスク	中等度

Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 アロキシ静注 ポララミン注 デキサート注	100mL 0.75mg 5mL 5mg 1mL 6.6mg 2mL	点滴静注	30分	day 1・8
1'	生食 アロキシ静注 プロイメンド注 ポララミン注 デキサート注	250mL 0.75mg 5mL 150mg 5mg 1mL 6.6mg 2mL		30分	
2	生食 アービタックス注	250mL 初回400mg/m ² 2回目～250mg/m ²		1時間	
3	生食	50mL		5分	
4-a (メイン)	5%ブドウ糖注 レボホリナート注	250mL 200mg/m ²		2時間 (bと同時)	day 1
4-b (側管)	5%ブドウ糖注 イリノテカン注	250mL 150mg/m ²		90分間 (aと同時)	
5	生食 フルオロウラシル注	100mL 400mg/m ²	15分		
6	生食 フルオロウラシル注	適宜 2400mg/m ²	持続静注 (シユアフューザー)	46時間	day 1-3

※制吐剤は1か1'のどちらかを実施