

レジメン名	GN
対象疾患名	膀胱癌
1クールの日数	28日間
催吐性リスク	高度

Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ハルトマン輸液pH8	1000mL	点滴静注	60mL/h	day 1
2	生食 アロキシ静注 デキサート注 ファモチジン注	100mL 0.75mg 5mL 3.3mg 1mL 20mg		30分	
3	生食 ゲムシタビン注	100mL 1000mg/m2		30分	
4	ハルトマン輸液pH8	1000mL		150mL/h	day 2
5	ハルトマン輸液pH8	1000mL		150mL/h	
6	生食 デキサート注 ファモチジン注	100mL 3.3mg 1mL 20mg		30分	
7	生食 アクプラ注	250mL 70mg/m2		5時間	
8	ラシックス注	10mg 1mL	静注		
9	ノバミン錠	5mg 3T/分3	内服	7日間	day 1-7
10	ソルラクトS輸液	500mL	点滴静注	2時間	day 8・15
11	生食 アロキシ静注 デキサート注 ファモチジン注	100mL 0.75mg 5mL 3.3mg 1mL 20mg		30分	
12	生食 ゲムシタビン注	100mL 1000mg/m2		30分	
13	生食	50mL		5分	

※day1・2は入院、day8・15は外来で施行。