

| | |
|---------|--------|
| レジメン名 | XELIRI |
| 対象疾患名 | 大腸がん |
| 1クールの日数 | 21日間 |
| 催吐性リスク | 中等度 |

| Rp | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|-----------------------------------|---|------|------|------------------------|
| 1 | 生食 アロキシ静注 デキサート注 | 100mL 0.75mg 5mL 6.6mg 2mL | 点滴静注 | 30分 | day 1 |
| 1' | 生食 アロキシ静注 プロイメンド注 デキサート注 | 250mL 0.75mg 5mL 150mg 6.6mg 2mL | | 30分 | |
| 2 | 生食 イリノテカン注 | 250mL 200mg/m ² | | 90分間 | |
| 3 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | カペシタビン錠 | ※下記参照 | 内服 | 14日分 | day 1(夕)- day 15(朝) |

※制吐剤は1か1'のどちらかを実施

※カペシタビン投与量(処方目安)

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 体表面積(m ²) | 1.31未満 | 300mg 6錠/日 |
| | 1.31以上1.69未満 | 300mg 8錠/日 |
| | 1.69以上2.07未満 | 300mg 10錠/日 |
| | 2.07以上 | 300mg 12錠/日 |